

¿CÓMO AFECTA EL GENOTIPO DEL VPH? GENOTIPO EN LESIONES DE ALTO GRADO. REVISIÓN DE CASOS.




Carmen Fernández Díaz, Hospital Universitario de Burgos, Burgos; Cristina Gallego de Lary, Hospital Universitario de Burgos, Burgos; Lucía Casás Serrato, Hospital Universitario de Burgos, Burgos; Sara Garcimartín Sanz, Hospital Universitario de Burgos, Burgos; Amaia Casado Martínez, Hospital Universitario de Burgos, Burgos; Sara del Olmo Bautista, Hospital Universitario de Burgos, Burgos.

Estudio retrospectivo de 98 pacientes con conización cervical en el último año.


Objetivos:

- Determinar la proporción de lesiones de alto grado en pacientes con conización.
- Analizar la relación entre VPH16/18 y el grado histológico (CIN2, CIN3).
- Comparar resultados con la literatura y estándares AEPCC.


CIN 2



CIN 3



Total conizaciones n=98



- VPH16 es el genotipo que más está presente en lesiones de alto grado, especialmente CIN3.
- VPH18 está presente en menos casos, pero mantiene relevancia en lesiones severas.
- La coinfección 16+18 aparece en una proporción no despreciable (6-12%), lo que podría tener implicaciones en la progresión lesional.

Conclusión: En nuestra serie, el 83% de las piezas de conización presentaron lesiones de alto grado ($\geq$ CIN2), mientras que únicamente el 2% resultaron negativas para lesión histológica. Los resultados concuerdan con los estándares de calidad de la AEPCC, cumpliendo los criterios recomendados al alcanzar una confirmación de lesión $\geq$ CIN2 superior al 70% y un porcentaje de piezas sin lesión $\leq$ 15%.