

OBJETIVOS

- La **neoplasia vaginal intraepitelial** (VaIN) es una lesión precursora del cáncer asociada a la infección del virus del papiloma humano (VPH), con repercusiones significativas sobre la salud sexual femenina y en su calidad de vida. A pesar de su creciente relevancia, se trata de una lesión de difícil diagnóstico y no existe un consenso claro sobre su manejo.
- El objetivo principal de este estudio es evaluar la incidencia del VaIN tras histerectomía y los factores de riesgo.

MÉTODOS


- Diseño: estudio observacional prospectivo en 32 pacientes.
- Variables estudiadas: edad, presencia de factores de riesgo VPH, motivo de histerectomía, seguimiento de VaIN, tratamiento recibido.

CONCLUSIONES


- Existe una alta incidencia de VaIN tras histerectomía, especialmente en histerectomías de causas no displásicas (80'0%).
- En el grupo de displasia cervical, un tercio de las pacientes desarrolló VAIN tipo 1 o 2 y otro tercio VAIN tipo 3, lo que refleja una alta carga de enfermedad residual o recurrente.
- Predominio en esta población de genotipos de VPH-AR no 16/18, lo que sugiere que estos subtipos representan un papel importante en la persistencia postquirúrgica.
- La alta prevalencia de factores de riesgo resalta la importancia de las intervenciones preventivas sobre factores de riesgo modificables en este grupo de pacientes.

RESULTADOS

Grupo displasia cervical (n=26)



- 8 de las pacientes no desarrollaron VAIN en el seguimiento tras la histerectomía.
- 9 de las pacientes desarrolló VAIN tipo 3, en 6 de las cuales se detectó VPH-AR no 16/18.
- 9 pacientes presentaron VAIN tipo 1 o 2 en el seguimiento. En 8 pacientes se detectó VPH-AR no 16/18 y en 1 paciente VPH 18.



Grupo otras causas (n=5)

- 4 de las pacientes desarrolló VAIN (2 VAIN tipo 1 o 2 y 2 VAIN tipo 3).
- En todos los casos en los que se desarrolló VAIN se detectó VPH-AR + (3 con genotipos no 16/18 y 1 con genotipo 18).

FACTORES DE RIESGO:

- 52'2% fumadoras.
- 34'8% no utilizaban métodos barrera.
- 73'9% vacunadas vs VPH.
- 13'0% cribado inadecuado.
- 26'1% no pareja estable.
- 8'7% inmunosupresión (VIH + y LES).