


VALORACIÓN DE MÁRGENES DE CONIZACIÓN GUIADO POR COLPOSCOPIA EN NUESTRO CENTRO

****M^a Magdalena Nae Frangulea, **Mónica Noelia González Fadrique, **Alicia Mayo López, **Arancha Santiago Garrido, **Diego M^a Pich-Aguilera Barroso **Amaya Martín Manjón, ** Hospital Universitario Río Hortega Valladolid**

OBJETIVOS: Evaluar la afectación de los márgenes de las conizaciones guiadas por colposcopia en pacientes atendidas en nuestra unidad, identificando la prevalencia de márgenes afectados y libres, y analizar la relación con las indicaciones clínicas y características de las lesiones.

MÉTODOS: Estudio retrospectivo con pacientes sometidas a conización guiada por colposcopia desde enero de 2023 hasta diciembre de 2024. Se recopilaban datos demográficos, indicaciones clínicas, y resultados histopatológicos: afectación de los márgenes endocervical y exocervical. La edad media de las pacientes fue de 39,84 años. La principal indicación fue biopsia cervical compatible con H-SIL en 158 pacientes, y L-SIL en 7 pacientes. La evaluación de los márgenes se realizó mediante análisis histopatológico, clasificando los márgenes como afectados, libres o no valorables.



CONCLUSIONES: En nuestro centro, solo el 74% de las conizaciones presentaron márgenes libres, superando el 20% de márgenes positivos establecido como estándar por la AEPCC. La afectación fue más frecuente en el borde endocervical, lo que sugiere mejorar la planificación en lesiones con zona de transformación tipo 3, incluyendo toma endocervical. También se recomienda seleccionar el tipo de conización más adecuado y evitar fulguraciones excesivas. Además, es esencial ajustar las indicaciones a los protocolos actuales para reducir márgenes afectados y optimizar los resultados.