

VALORACIÓN DE LAS RECONIZACIONES EN NUESTRO CENTRO EN LOS AÑOS 2019-2024

Pérez de la Mata V, Camacho Carrasco M, Fernández-Villarrenaga Vázquez L, Japón Chaves R, Hernández García A, Yera Gilabert M

OBJETIVOS:

Analizar en el grupo de las reconizaciones realizadas en 6 años en el Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva, y la relación de estas con los VPH 16 y 18; así como la comparación con los genotipos asociados a un primer tratamiento escisional.

Como objetivo secundario hemos analizado la cobertura vacunal en mujeres conizadas como grupo de riesgo.

MÉTODOS:

ESTUDIO OBSERVACIONAL, RETROSPECTIVO, DESCRIPTIVO.

Datos extraídos de la base de datos recogida entre 2019 y 2024:

- 766 conizaciones, de ellas 99 reconizaciones

Principales variables analizadas:


- Condición de reconización (sí/no). Determinación de VPH. Estado vacunal frente a VPH (vacunada/no vacunada). Cobertura vacunal en paciente conizada

CONCLUSIONES:


Las pacientes sometidas a reconización presentan mayor frecuencia de positividad para VPH16 frente a aquellas con conización primaria, sugiriendo mayor probabilidad de necesitar una reconización si la infección es producida por este genotipo. La vacunación se asoció con menor prevalencia de VPH16 incluso en el subgrupo de reconizaciones, reforzando su papel protector. Por otro lado, la infección por VPH18 fue poco frecuente y no mostró un patrón consistente en relación con la reconización.

RESULTADOS:


Porcentaje de reconizaciones




Evolución del porcentaje de reconizaciones




VPH en reconizaciones



Cobertura vacunal



Porcentaje de VPH16 y 18 + por etapas



VPH en 1ª conización

