

Análisis del cribado y seguimiento ginecológico en mujeres con infección VIH en el Hospital de Getafe



Rosario Granados¹, Sergio Rodríguez², Natalia Ruiz¹, Isabel Solís³, Lourdes Molpeceres³, Estefanía Nicolás³

37AEPCC0239

Servicios de Anatomía Patológica (1), Medicina Interna (2) y Ginecología (3). Hospital Universitario de Getafe. Madrid

INTRODUCCIÓN

Las mujeres con infección por VIH requieren cribado cada 3 años y seguimiento especial por alto riesgo de neoplasias anogenitales.

Objetivo:

Evaluar el seguimiento ginecológico y la incidencia de lesiones preneoplásicas y neoplásicas en mujeres con infección del VIH en el Hospital de Getafe en Madrid.



METODOLOGÍA Y RESULTADOS

160 mujeres con infección por VIH estudiadas

	♀ con lesión	♀ sin lesión		
			Seguimiento ginecológico	69,4%
			Seguimiento adecuado	73,9%
			Seguimiento esporádico	26,1%
			Seguimiento con HPV	54,9%
			Prevalencia de HPV	26,2%
			Lesiones AG anogenitales (12 cérvix, 3 vulva, 3 combinadas)	22% con cribado adecuado
<500 cel. CD4+/ul	77,9%	25,6% (p=0,000028)		
Media años infección HIV	15,2	20,1 (p=0,046)		
Edad media	45 años	52 años		

CONCLUSIONES

Hay asociación significativa entre marcadores de baja inmunidad (cél. CD4 circulantes) y lesiones pre/neoplásicas anogenitales.

Aunque la mayor parte de mujeres VIH-positivas tuvieron seguimiento aceptable, se requiere un esfuerzo multidisciplinar para adecuarse a las recomendaciones científicas.