

¿Qué factores condicionan la aparición de VAIN en pacientes con histerectomía realizada por CIN-3?



Alonso-Lamberti Zarauza Fabiola, Robisco Díaz Eva, García Ibáñez Jorge, Ramírez Hurtado Jorge, Bermejo Martínez Rocío, Bolívar de Miguel Ana Belén

Hospital Universitario 12 de Octubre. Unidad de Patología Cervical.

INTRODUCCIÓN

El VaIN es una entidad infrecuente y habitualmente poco sintomática. Representa el 0,4% de todas las lesiones premalignas del tracto genital inferior, aunque probablemente estas cifras infraestiman la prevalencia real. Debido a la baja prevalencia de esta lesión, existe menos literatura al respecto en comparación con las de otras localización, como el CIN.


OBJETIVO: Determinar **factores predisponentes para la aparición de VaIN** en pacientes histerectomizadas por lesiones precancerosas cervicales

MÉTODOS

Estudio **observacional retrospectivo** que incluyó a 46 pacientes **tratadas por CIN-3 mediante histerectomía** en la Unidad de Patología Cervical del Hospital Universitario 12 de Octubre entre 2014 y 2022. Se empleó el test de chi-cuadrado y el test estadístico de Fisher.

RESULTADOS

Se analizaron **46 pacientes** con edad media de 50 años. Un **10.8% (n:5) desarrollaron VaIN o carcinoma vaginal** durante el seguimiento tras la intervención. La media de tiempo entre la histerectomía y la aparición de la lesión vaginal fue de **17.6 meses**.



Las siguientes variables estudiadas durante el seguimiento tras la histerectomía se relacionaron de manera estadísticamente significativa con la aparición de lesión vaginal: presencia de **lesión vaginal previo a la histerectomía** (p:0.0061), **hallazgos en colposcopia previo a histerectomía** (p:0.0323). No se encontró relación con el resto de variables estudiadas: inmunosupresión (p: 0.24), tabaquismo (p:0.57), vacunación para VPH (p:0.57), edad (p:0.29), número de conizaciones (p:0.31).

CONCLUSIÓN

Llama la atención que uno de los factores que según nuestros datos se asocian con el desarrollo de lesión vaginal es la presencia de la misma previo a la histerectomía, lo que subraya una vez más, la **importancia de una exploración física cuidadosa durante el seguimiento de estas pacientes**.