

EL RETO DEL VAIN, NUESTROS DATOS


De Castro Momoitio, A; Vázquez del Campo, A; Erasun Mora, D; Moreno, L; Hernández, M; Zorrilla, B.

Objetivos:

La neoplasia intraepitelial vaginal (VAIN) es una lesión precursora poco frecuente del carcinoma vaginal, asociada principalmente a infección persistente por virus del papiloma humano (VPH), inmunosupresión, antecedentes de neoplasia intraepitelial cervical o vulvar y determinados hábitos de riesgo. Pese a que existen diversas opciones terapéuticas, la evidencia es limitada y no hay consenso sobre la estrategia óptima, especialmente en recurrencias. El objetivo fue analizar la experiencia clínica en los últimos cinco años en nuestra unidad, describiendo el perfil de pacientes con VAIN, factores de riesgo asociados y tratamientos empleados.

Métodos:

- Estudio retrospectivo y longitudinal con VAIN en los últimos cinco años.
- 29 mujeres, 6 abandonaron.
- Edad media 57 años.



Conclusiones:

La mayoría de las pacientes con VAIN precisaron múltiples líneas de tratamiento, lo que refleja la elevada persistencia y recurrencia. Aunque las estrategias iniciales más comunes fueron vigilancia e Imiquimod, un número considerable requirió escalada hasta tercera o cuarta línea. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de seguimiento estrecho, mejor selección del tratamiento inicial e investigación en alternativas más eficaces para mejorar las tasas de aclaramiento.

