

FACTORES EPIDEMIOLOGICOS ASOCIADOS A LA NECESIDAD DE CONIZACIÓN CERVICAL.

Garcimartín Sanz S, Gallego de Lary C, Casado Martínez A, Fernández Díaz C, Iguñiz Michelena A, del Val Gómez M.

OBJETIVOS

El objetivo del estudio fue analizar las características epidemiológicas de mujeres sometidas a conización en nuestro centro con el fin de detectar los factores de riesgo que puedan estar asociados a ellas.


MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional descriptivo retrospectivo sobre mujeres conizadas en nuestro hospital durante el año 2024 (n=98).
Variables analizadas: edad, origen de derivación, debút sexual, número de parejas sexuales, vacunación, tabaquismo, anticoncepción, paridad y menopausia.


CONCLUSIONES

- ✓ La mayoría de pacientes conizadas son mujeres en edad fértil entre los 35-50 años.
- ✓ El uso del preservativo sigue sin ser utilizado por la mayoría de pacientes positivas para VPH y un alto porcentaje de ellas no están vacunadas por lo que son medidas en las que se debe seguir incidiendo.
- ✓ Aunque el porcentaje de fumadoras en nuestra muestra es algo menor a lo referido en algunos estudios en España, la recomendación del abandono en las consultas de patología cervical sigue siendo de vital importancia.

VACUNACION VPH



MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS



RESULTADOS

- Edad media 42 años: ninguna <25 años, 4% 25-30 años, 17% 30-35 años, 60% 35-50 años, 17% 50-65 y 1% >65 años.
- 18.3% estaban en menopausia
- 41.8% habían tenido más de 1 parto.
- 76.5% acudían a consulta derivadas del programa de cribado, 11.2% de clínica privada y 12% de otras localizaciones.
- El 14.2% habían iniciado relaciones sexuales ≤16 años. Un 16.3% habían tenido ≥10 parejas sexuales. En 39 mujeres no se obtuvieron estos datos
- El 39.7% de mujeres fumaban. En 6 pacientes no se recogió esta información.
- 60.2% utilizaban algún método anticonceptivo. En 28 pacientes se desconoce el dato. Entre las usuarias de anticoncepción, la distribución por métodos fue: 44% ACOC, ninguna píldora solo gestágenos, 3.3% implante, 17% DIU, 35.5% método barrera.
- El 31.6% había recibido la pauta de vacunación completa previa a la conización frente al 46% que no estaban vacunadas. En 22 pacientes no se recogió el dato.