


Distribución por edades de los genotipos de VPH en lesiones de alto grado en nuestra población



Almansa González, C; Tobaruela Coba, C; Díez Álvarez, A; Tejerizo García, A.


Método: Estudio retrospectivo de 150 mujeres diagnosticadas de HSIL en el Hospital 12 de Octubre durante 2022.

Resultados



Distribución de lesiones HSIL

VPH	< 25	25-35	35-45	> 45
Neg	0 (0)	0 (0)	1 (2, 2)	2 (4, 0)
16	0 (0)	23 (54, 8)	22 (47, 8)	14 (28, 0)
18	1 (50, 0)	1 (2, 4)	2 (4, 3)	3 (6, 0)
AR	1 (50, 0)	18 (42, 8)	21 (45, 7)	30 (60, 0)
BR	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (2, 0)



Genotipos según localización

Edad	VPH 16 y 18	VPH AR no 16/18	P valor
<45 años	49 (55,1)	40 (44,9)	0,046
≥45 años	17 (37,0)	29 (63,0)	

Distribución y comparación de genotipos por edad

Conclusiones

Los genotipos 16/18 se identificaron en casi la mitad de las lesiones, siendo más prevalentes en mujeres menos de 45 años. En mujeres mayores de 45 años predominan los genotipos no 16/18.

