

RELACIÓN DE MÁRGENES DE CONIZACIÓN Y ACLARAMIENTO VIRAL A LOS 6 MESES DE CONIZACIÓN

Mónica Noelia González Fadrique*, Alicia Mayo López**, Marina Inés Bataller Canet**, María Magdalena Nae Fraguera**, Carmela Castro Esteban**, Marta García-Yuste González*
*Hospital Universitario Río Hortega. Ginecología. Unidad de Patología Cervical. **Hospital Universitario Río Hortega. Ginecología.


OBJETIVOS

El virus del papiloma humano (VPH) es la principal causa de cáncer de cérvix y lesiones intraepiteliales. La conización cervical es el tratamiento de elección en la mayoría de pacientes con lesiones H-SIL. El estado de los márgenes quirúrgicos es un factor pronóstico relevante. El aclaramiento del VPH posterior se considera un indicador de respuesta terapéutica, y su persistencia se asocia con mayor riesgo de recurrencia. El presente estudio evalúa la asociación entre márgenes libres y persistencia del VPH en los primeros 6 meses tras la conización.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realiza un estudio retrospectivo usando una base de datos de 310 pacientes del Hospital Río Hortega de Valladolid a las que se le realizaron conizaciones desde el 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre de 2024. Se evalúa el estado de los márgenes y la presencia de VPH 6 meses tras la conización.

RESULTADOS



CONCLUSIONES

Estos resultados sugieren que, aunque la obtención de márgenes quirúrgicos libres es un objetivo quirúrgico relevante, ya que es un factor de riesgo de enfermedad residual, no garantiza por sí sola el aclaramiento viral a corto plazo.

La persistencia del VPH, incluso con márgenes negativos, refuerza la necesidad de un seguimiento estrecho, así como la identificación de otros factores pronósticos implicados en la eliminación viral. Es importante incidir en la corrección de los cofactores de persistencia de VPH para así contribuir al aclaramiento del virus.

En la práctica clínica, estos hallazgos apoyan la importancia de realizar un co-test en el control posquirúrgico para optimizar la detección temprana de pacientes con mayor riesgo de recurrencias.

1/3 de las pacientes con conización con márgenes libres mantuvieron positividad viral