

VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN LAS PAREJAS DE MUJERES INFECTADAS: APLICABILIDAD DEL "HPV QoL"

S. Capote, A. Trujillo Heredero, R. Chaves, G. González, C. Molina, J. Lleberia
Fundació Hospital de l'Esperit Sant, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona

Antecedentes

Cuestionarios validados como el "HPV QoL" permiten objetivar el impacto negativo bio-psico-social que tiene la infección del Virus del Papiloma Humano (VPH) en las mujeres infectadas.

No existen estudios ni cuestionarios validados acerca del impacto que dicha infección tiene en la calidad de vida (QoL) de las parejas de las mujeres infectadas

Objetivos

- ☀ Conocer el **impacto en la QoL que la infección por el VPH tiene en las parejas de las mujeres infectadas** utilizando el cuestionario HPV QoL adaptado para parejas
- ☀ Objetivar el impacto que esta intervención tiene en la vacunación contra el VPH de las parejas de mujeres infectadas.


Métodos

- Estudio transversal con análisis descriptivo cualitativo (Test de Chi-Cuadrado) y cuantitativo (Test de T-Student).
- Datos obtenidos en el cuestionario "HPV QoL" por las parejas de mujeres infectadas por VPH.
- Criterios de exclusión: profesional sanitario, infección previa por VPH o incapacidad de autorizar la entrada en el estudio.
- Disminución QoL: puntuación < 65

Resultados


- n= 127 (26 mujeres, 101 hombres)
- Edad media: 36 años (min 21-máx 55)
- El 13% (n=17) comunicaron vacunación previa contra el VPH.

DISMINUCIÓN QOL (<65)




No se observan diferencias estadísticamente significativas en el impacto de la QoL según la etnia, el nivel educativo, la actividad sexual o el estado de vacunación contra el HPV.

Deseo vacunación HPV



Vacunación a los 12 meses



Conclusiones

- ✓ Se evidencia por primera vez el **impacto negativo en la QoL que la infección por el VPH tiene también sobre las parejas de las mujeres infectadas.**
- ✓ Dicha disminución de la QoL **impacta de forma directa y positiva en la vacunación contra el VPH de las parejas de las mujeres infectadas por el VPH:** vacunación del 36% de la muestra (n=40) a los 12 meses.