

IMPACTO DE LA MENOPAUSIA EN LA EVOLUCIÓN DE LAS PACIENTES CONIZADAS

Mónica Noelia González Fadrique, Diego María Pich Barroso, María Magdalena Nae Frangulea, Marina Bataller Canet, Arancha Santiago Garrido, Ana María Pérez Miguel. *Hospital Universitario Río Hortega*

Antecedentes/Objetivos

Las mujeres posmenopáusicas, tras conización, presentan con mayor:



- Frecuencia de **márgenes positivos** → riesgo de enfermedad residual tras la conización.
- Tasa de persistencia de **infección/citologías anormales**.

Observar las diferencias entre el estado menopáusico y su relación con la afectación de los márgenes, así como la persistencia tras conización.

Métodos

- Estudio retrospectivo de pacientes conizadas entre 1/1/2022 – 31/12/2024 (n=310) en el Hospital Universitario Río Hortega.
- La técnica quirúrgica fue conización con asa de diatermia.
- Se recogieron datos el estado menopáusico, la afectación de bordes, el resultado del test de VPH y de la citología en el control tras la conización.
- Se realizó una comparación en ambos grupos.

Resultados



Siglas: MEnA (Márgenes endocervicales afectos), MExA (Márgenes exocervicales afectos)

El aclaramiento de VPH resultó ser el único resultado estadísticamente significativo ($p < 0,001$).

Conclusiones

- La postmenopausia se asocia a **mayor persistencia de VPH** tras conización en nuestra área.
- Los cambios hormonales, las peores condiciones de salud y un posible sistema inmune debilitado están relacionados con **peor evolución** de estas pacientes
- Insistir e informar a las pacientes de la importancia de un **seguimiento adecuado** y de estimular abandono tabáquico, uso del preservativo y vacunación.