

Relación entre los hallazgos colposcópicos y diagnóstico histológico final.

Murillo A., Del Valle D., Agesta G.



Introducción

La colposcopia es una herramienta clave para guiar el diagnóstico y tratamiento de lesiones cervicales. Sin embargo, su capacidad para predecir la severidad de la lesión puede verse limitada.

Objetivo y métodos

Estudio observacional retrospectivo realizado en mujeres sometidas a conización en el Hospital Universitario Donostia durante el 2024, con el objetivo de analizar la asociación entre los hallazgos colposcópicos y el diagnóstico histológico final.

Resultados

1. Distribución de hallazgos colposcópicos e histología final:

	Histología alto grado	Histología bajo grado	Total
Cambios grado 1	97	10	107
Cambios grado 2	67	4	71
Colposcopia normal	34	25	59
total	198	39	237

2. Rendimiento diagnóstico de la colposcopia:

Sensibilidad 33.84 %, especificidad: 89.74%.

VPP: 94.37 %, VPN: 21.08 %.

Asociación estadística: χ^2 7.55, gl=1, p = 0.006 → asociación significativa entre colposcopia con cambios grado 2 y lesión histológica de alto grado.

Conclusiones

- ✓ La colposcopia con cambios grado 2 presenta un **alto valor predictivo positivo**, lo que respalda su utilidad para identificar lesiones de alto grado. Sin embargo, la **sensibilidad fue baja**, evidenciando que una proporción importante de lesiones de alto grado no presentaron cambios grado 2 en el estudio colposcópico.
- ✓ Estos resultados subrayan la importancia de considerar otros factores diagnósticos (citología, antecedentes, pruebas complementarias) para evitar infradiagnósticos, especialmente en colposcopias con cambios grado 1 o normales.