

RESULTADOS DE LOS PRIMEROS AÑOS DEL PROGRAMA DE CRIBADO POBLACIONAL DE CÁNCER DE CÉRVIX DE EUSKADI (2018-2023)

A. Dávila Expósito; E. Arenaza Lamo; M.B. Roncero Santos; D. del Valle Peña; J.W. Comba Miranda; A. Arrospide Elgarresta

Programa de cribado de cáncer de cérvix de Euskadi.



ANTECEDENTES/OBJETIVOS: En 2018 se inició la implantación del **cribado poblacional de cáncer de cérvix en Euskadi**, alcanzando una **cobertura de invitación del 100% en diciembre de 2024**. En **2023** se incorporó el **genotipado parcial**. El **objetivo** es **describir los resultados del Programa entre 2018 y 2023**.

METODOLOGÍA: Estudio descriptivo, transversal y retrospectivo de los resultados obtenidos durante la implantación y despliegue del programa entre 2018 y 2023. Se analizaron los datos de **427.378 mujeres con cribado concluyente**.

RESULTADOS:

TASAS	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tasa de resultado de bajo riesgo	91,01%	92,51%	92,56%	93,38%	93,86%	92,80%
Tasa de positividad VPH con prueba primaria VPH-AR 35-65 años	10,80%	7,17%	6,24%	3,92%	4,88%	5,75%
Tasa positivos control al año (% sobre participantes)	3,62%	3,09%	2,42%	1,92%	2,67%	4,86%
Tasa positivos colposcopia (% sobre participantes)	4,97%	3,75%	4,48%	3,85%	3,47%	2,36%
Adherencia a la colposcopia (% sobre positivos)	100,00%	95,84%	96,31%	97,07%	96,72%	98,33%
Tasa detección lesión bajo grado x 1.000 participantes	13,42‰	9,95‰	12,08‰	9,62‰	7,63‰	4,80‰
Tasa de detección lesión alto grado X 1000 participantes	16,11‰	7,56‰	9,57‰	7,34‰	6,30‰	5,82‰
Tasa detección cáncer invasivo x 1.000 participantes	1,34‰	0,22‰	0,14‰	0,15‰	0,16‰	0,20‰
Valor predictivo positivo Lesión de alto grado	32,43%	21,04%	22,16%	19,66%	18,79%	25,07%
Valor predictivo positivo Cáncer invasivo	2,70%	0,62%	0,32%	0,41%	0,49%	0,85%

CONCLUSIONES:

En los primeros seis años del programa se ha observado un **descenso en las tasas de lesiones y cáncer de cuello uterino**, atribuible a la **detección y tratamiento inicial de casos prevalentes** y a la **ampliación de la cobertura poblacional**, lo que indica una **efectividad temprana del Programa**.

Tras la implantación del **nuevo protocolo con test de VPH-ADN y genotipado parcial en 2023**, se ha evidenciado una **reducción significativa de las lesiones de alto grado y de las derivaciones a colposcopia** ($p < 0.0001$), junto con un **aumento del valor predictivo positivo** ($\approx +5$ pp, $p < 0.0001$), que refleja una **mayor eficiencia en las derivaciones**. Por contra, se observa una **pérdida de adherencia al seguimiento en el control intermedio (control anual)**.

Será necesario **seguir evaluando el impacto del nuevo test y protocolo** a lo largo del tiempo y **reforzar las estrategias para mejorar la adherencia al control anual**.