

Cánceres cervicales diagnosticados en el Hospital universitario de Basurto en el periodo de 2021 al 2024

Antecedentes/Objetivos:

Analizar de forma retrospectiva los cánceres de cérvix diagnosticados en nuestro hospital (2021-2024), valorando la presencia de síntomas al diagnóstico, citología previa, hallazgos colposcópicos , tipo histológico de cáncer de cérvix y estadio.

Objetivar que el estadio de los cánceres diagnosticado en nuestra UPC, provenientes del cribado en mujeres asintomáticas , tiene un estadio más precoz al diagnóstico comparado con las paciente sintomáticas y sin cribados cervicales previos

Métodos:

Colección de casos de forma retrospectiva , diagnosticados en nuestro hospital desde el 2021 al 2024.

Variables a estudiar:

- 1Sintomatología.
- 2Citología previa al diagnóstico.
- 3Hallazgos colposcópicos.
- 4Tipo histológico
- 5.Estadio del cáncer

Resultados:

Analizamos 54 casos de cánceres de cérvix:.

1. Respecto a la **sintomatología**:

-18 de ellos (33 %): sintomáticos

36 de ellos (66,6%): asintomáticos .

Entre los asintomáticos:

2 (pérdidas de seguimiento), 1 (diagnóstico en pieza de histerectomía vaginal), 1 (derivada de centro externo)

-El resto :32 pacientes asintomáticas, provenientes del programa de cribado .

2 Respecto a la **citología**:

-Citología sugestiva de cáncer de cervix:4

-HSIL , HPV +:15

-AGC:6

-ASCH ,HPV+.0

-LSIL ,HPV +.0

-ASCUS +HPV+ 3

-Citología negativa + HPV +:4

-No citologías (dg por biopsia en pacientes sintomáticas):12

3Respecto a los **hallazgos colposcópicos**:

-Sospecha de invasión:10

-Cambios grado 2 :28

-Cambios grado 1:3

-Normal:1

-No colposcopia12

4 Respecto al **tipo histológico** de los cánceres dignosticados

De los 54 cánceres de Cérvix :12 corresponde a adenocarcinomas, el resto ca. epidermoides.

5Respecto al **estadio**:

Entre las sintomáticas: un 94 % estadios mayores de estadio I .

Entre las asintomáticas: un 90% diagnosticadas en estadio I

Conclusiones/Recomendaciones:

En pacientes asintomáticas ,provenientes del programa de cribado poblacional , el estadio es más precoz (90% de ellos en estadio I)que las pacientes que consultan por síntomas (94% diagnosticadas en estadios mayores al I.), lo que refuerza seguir en esta dirección de cribados poblacionales y de unidades de patología cervical especializadas