

ESTRATEGIA COMBINADA CON LÁSER CO₂ E IMIQUIMOD EN VAIN DE ALTO GRADO, A PROPÓSITO DE UN CASO.

García-Valdecasas García L.M, Batlle Costa C, Ocete Villegas A, Ponferrada Rodríguez J, González Martínez S, Claudio Delgado M.D

OBJETIVO

Presentar la experiencia clínica en el manejo de una **VaIN extensa de alto grado** mediante tratamiento combinado con **Imiquimod tópico y láser CO₂**.



CASO CLÍNICO

48 años, remitida por VPH 16 positivo, citología negativa.

- Colposcopia: Cambios mayores muy marcados y dispersos por todo el cérvix. Se realizan múltiples biopsias con resultado HSIL.
- Vaginoscopia: lesiones **acetoblancas, lugol negativas** en los **2/3 superiores vaginales**, con áreas más marcadas a las 3–4 h y 6–8 h, se toman biopsias múltiples con resultado **VAIN 3**
- Conización cervical inicial: **carcinoma escamoso in situ (márgenes libres)**.
- Nueva conización por persistencia HSIL→**HSIL con márgenes libres**.
- Tratamiento vaginal: **Imiquimod tópico + 3 sesiones de vaporización con láser CO₂**.

RESULTADOS

Marcada **reducción de la extensión de las lesiones**, limitadas al tercio superior vaginal, poateriamente histerectomía simple, salpinguectomía bilateral y escisión del rodete vaginal.



CONCLUSIÓN

El **tratamiento combinado de Imiquimod y láser CO₂** resultó **efectivo y bien tolerado**, permitiendo una **reducción significativa de las lesiones** antes de la cirugía.