

¿MEJORA EL RENDIMIENTO DEL LEGRADO ENDOCERVICAL EL USO DE ESTRÓGENO VAGINAL EN PACIENTES MENOPÁUSICAS?

M.D. Claudio ⁽¹⁾; E. López ⁽²⁾

1. MIR 3 Ginecología y Obstetricia Hospital de Poniente (El Ejido, Almería)

2.FEA Ginecología y Obstetricia Hospital de Poniente (El Ejido, Almería)

INTRODUCCIÓN

La Terapia Estrogénica Local (TEL) aumenta la elasticidad y grosor de los tejidos vulvovaginales permitiendo al regenerar el epitelio vaginal en pacientes menopáusicas.

En la consulta de patología cervical, nos encontramos ante numerosas citaciones para repetir muestra de legrado endocervical en pacientes menopáusicas por muestra insuficiente.

OBJETIVOS


Analizar si mejora el rendimiento del legrado endocervical en las pacientes menopáusicas pautando estrógeno local previo.

MATERIAL Y MÉTODOS


Estudio analítico retrospectivo entre Enero-Abril de 2024 en un hospital comarcal incluyendo mujeres post menopáusicas con legrado endocervical insuficiente.

Se pauta estrógeno local un mes y se repite la toma comparando la obtención de material de ambos legrados.

Uso de Terapia Estrogénica Local



LEC previo




1ª Toma

54 mujeres estudiadas
*15 En tratamiento con TEL
*39 Sin uso de estrógenos

2ª toma tras TEL

LEC tras TEL



p>0,05

CONCLUSIONES

El uso de estrógenos vaginales en pacientes menopáusicas parece mejorar el rendimiento del legrado endocervical en 0'2 puntos.

A pesar de esto resultados prometedores, se necesita continuar el estudio aumentando la muestra para optimizar el número de visitas y lograr disminuir las pruebas invasivas para las pacientes.