

Conización por legrado endocervical afecto: concordancia en nuestra serie de pacientes.

Jazmín Alexandra Bravo Shuira, Hanan El Hichou Ahmed, Marina Eulalia Mena Rina, María Ángeles Calderón Rodríguez, María Jesús Ramírez Mallol, Laura Revelles Paniza. Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada).



INTRODUCCIÓN

El legrado endocervical (LEC) es una técnica complementaria empleada en la detección de lesiones cervicales de alto grado. Su objetivo es identificar aquellas alteraciones no accesibles por biopsia dirigida.

La conización es el gold estándar para la confirmación de las lesiones premalignas precursoras de cáncer de cuello uterino y, aunque es sencilla y bien tolerada, no está exenta de complicaciones. En determinados casos, un LEC patológico puede ser la indicación para una conización. Por ello, resulta clave valorar su concordancia con el diagnóstico definitivo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se ha evaluado la proporción de conizaciones realizadas en nuestro centro únicamente por un LEC patológico y la concordancia diagnóstica entre LEC y conización.


Conizaciones totales (enero 2024 – junio 2025)	210 conizaciones		
Conizaciones por LEC patológico	81 (38,6%)	Conos con lesión de alto grado	64 (79%)
		Conos en blanco	17 (21%)

RESULTADOS

En nuestra serie, el 38,6% de las conizaciones se indicaron exclusivamente por un LEC patológico, proporción similar a la de otros centros, reflejando el peso de esta técnica en la toma de decisiones clínicas.

La confirmación histológica fue del 79%, con una sensibilidad del LEC del 83-95%.

La tasa de conos en blanco fue del 21%, valor que se encuentra dentro del rango internacional (10-30%) y que evidencia margen de mejora.



Conizaciones por LEC patológico

CONCLUSIONES

La conización constituye un procedimiento invasivo, con posibles repercusiones reproductivas y obstétricas, por lo que resulta fundamental que su indicación esté sólidamente justificada. Por este motivo, la existencia de una adecuada correlación diagnóstica no solo respalda la pertinencia de la conización, sino que además contribuye a garantizar la seguridad y la calidad del proceso asistencial.