

Liquen esclero-atrófico y sexualidad: Manejo quirúrgico de un Caso Clínico

Ariadna Silverio Ortega. Patricia Escamilla. Norberto Medina. Ana Virseda López

Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil de Canarias



Introducción

El liquen escleroso-atrófico es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta la región anogenital. Se asocia a prurito, dolor y dispareunia, impactando significativamente en la sexualidad femenina. Hasta el 59% presentan disfunción sexual. La fimosis o adherencias clitorianas pueden comprometer la función sexual y, en casos seleccionados, requerir cirugía. Presentamos un caso con evaluación objetiva mediante cuestionarios FSM y FSFI.


Caso Clínico



Primera visita
Noviembre 2023



Primera Cirugía
Enero 2024



Control postQx Feb-
Sept 2024



Segunda Cirugía
Ocube 2024



Ultimo control Marzo
2025

FSM	Puntuación	Área más afectada
Prequirúrgico	63 (disfunción sexual)	Orgasmo, Lubricación, Satisfacción
Postquirúrgico	79 (mejoría global)	Deseo, Satisfacción, Orgasmo

Conclusiones:

- El LE afecta de forma importante la función sexual
- La cirugía puede mejorar caso seleccionados de fimosis clitoriana
- Clave evaluar con cuestionarios validados
- Se necesita más evidencia sobre manejo quirúrgico