

Enfermedad de Paget Vulvar: características clínicas y evolución terapéutica en una cohorte retrospectiva (2004–2025)

María Duaso Pueyo, María Sol Perez, María Bordas Sole, María Cristina Centeno Mediavilla, Melissa Bradbury Lobato, Anna Brox Martin.

Hospital Universitari Vall d'Hebron



Introducción

La enfermedad de Paget vulvar (EPV) es una neoplasia intraepitelial rara, de curso crónico y con alta recurrencia. Aunque la cirugía sigue siendo el tratamiento estándar, han surgido alternativas conservadoras como imiquimod y láser CO₂, con eficacia aún incierta.

Objetivos

- Describir el perfil clínico, epidemiológico e histopatológico de pacientes con EPV.
- Analizar los resultados terapéuticos de cirugía, imiquimod y láser CO₂.
- Identificar factores asociados a recidiva y progresión

Material y métodos

- Estudio retrospectivo de 31 pacientes (2004-2025).
- Se recogieron datos clínicos, anatomopatológicos, IHQ, tipo de tratamiento y evolución.
- Se realizó análisis descriptivo, comparación de recurrencias y regresión logística multivariada.

Resultados

1. Perfil clínico y demográfico



- Edad mediana: 72 años (RIQ 60–80)
- Posmenopáusicas: 90%
- Comorbilidades: HTA 52%, dislipemia 48%, obesidad 29%
- Síntoma más frecuente: prurito (68%)
- Lesiones >2 cm: 61%
- Multifocalidad: 45%
- Aspecto predominante: eritematoso (39%)

2. Inmunohistoquímica

- CK7 positivo: 87%
- HER2: 14%, GCDP15: 9%, GATA3: 9%, CK20: 5%

3. Análisis multivariado:

- Edad: factor protector frente a recidiva (OR 0,86; IC95% 0,76–0,97; p = 0,018)
- No hubo diferencias significativas según tratamiento.



Conclusiones

La EPV presenta una elevada recurrencia independientemente del tratamiento; la edad parece influir como factor protector. Las alternativas conservadoras no mejoran claramente los resultados frente a la cirugía. Se requieren estrategias individualizadas, seguimiento prolongado y nuevas dianas terapéuticas para optimizar el control de la enfermedad.