

COMPARATIVA DE EVOLUCIÓN TRAS HISTERECTOMÍA POR CIN-3 EN PACIENTES INMUNODEPRIMIDAS VS INMUNOCOMPETENTES



Alonso-Lamberti Zarauza Fabiola, Robisco Díaz Eva, González Villar María Jesús, Abrisqueta Serrano Rocío, Almansa González Cristina, Bolívar de Miguel Ana Belén

Hospital Universitario 12 de Octubre. Unidad de Patología Cervical.

INTRODUCCIÓN


La histerectomía puede ser una opción en casos seleccionados de CIN3, aunque no elimina el riesgo de recurrencia. Según la literatura, tras la cirugía, las mujeres inmunocompetentes presentan baja incidencia de VaIN, mientras que las inmunosuprimidas muestran mayor persistencia del HPV y recurrencias más frecuentes, lo que exige un seguimiento más estrecho. **OBJETIVO:** Comparar el tiempo de aparición de lesiones o infección por VPH durante el seguimiento realizado a pacientes intervenidas de histerectomía total por lesiones precancerosas cervicales de alto grado en pacientes inmunodeprimidas vs inmunocompetentes.

MÉTODOS

Estudio **observacional retrospectivo** que incluyó a 46 pacientes tratadas por CIN-3 mediante histerectomía entre 2014 y 2022. Se realizó un **análisis de supervivencia** Kaplan-Meier comparando el tiempo de aparición de lesiones o infección por VPH durante el seguimiento.

RESULTADOS

Se analizaron **46 pacientes** con edad media de 50 años. El 18% (n=8) eran mujeres inmunodeprimidas. Cinco (62,5%) presentaron una infección o lesión por VPH tras la cirugía: tres lesiones de bajo grado y una de alto grado. En el grupo de mujeres inmunocompetentes (n = 38), se diagnosticó infección o lesión por VPH en 13 de ellas (34,2%), distribuidas en cuatro casos de bajo grado, uno de alto grado y dos carcinomas vaginales. Se perdió el seguimiento de siete pacientes, una perteneciente al grupo de inmunodeprimidas y seis al grupo de inmunocompetentes. **No se encontraron diferencias estadísticamente significativas** en el tiempo de aparición de lesiones o infección por VPH entre ambos grupos (p=0,7).



CONCLUSIÓN

Según nuestros datos, se encontraron prácticamente **el doble de casos de lesión o infección por VPH en pacientes inmunodeprimidas** a pesar de no encontrarse diferencias estadísticamente significativas, si bien es cierto, que sería preciso ampliar nuestro tamaño muestral