

¿Existen diferencias en las complicaciones de las conizaciones tipo LEEP con anestesia local vs anestesia general en el Hospital Universitari Mútua Terrassa durante el periodo de 2022 al 2025?

Carla Fernández Segura, Laura Balcells Eichenberger, Gemma Bosch Comes, Teresa Gironès Vallès, Ivana Jordà Santamaria.

OBJETIVO

Describir y comparar las complicaciones de la conización tipo LEEP con anestesia local (AL) versus anestesia general (AG).

MÉTODOS


Estudio observacional y retrospectivo en pacientes intervenidas de conización tipo LEEP con AL y AG en un único centro entre junio 2022 y julio 2025.

RESULTADOS


CONIZACIONES

■ Anestesia General (AG) ■ Anestesia Local (AL)


5.3% complicaciones



Complicaciones AG




Complicaciones AL



No se hallaron diferencias estadísticamente significativas en la incidencia de complicaciones entre ambos grupos ($p=0.57$).

Respecto a los márgenes, en el grupo de AG un 57.9% fueron positivos y en el grupo AL, un 37.4%.

Indicaciones de las conizaciones



CONCLUSIONES

La tasa de complicaciones hemorrágicas se encontró dentro de los criterios de calidad de la AEPCC para ambos grupos ($<5\%$).

No se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre las complicaciones de las conizaciones bajo AL y AG. La conización con AL resulta muy segura, pues permite obtener una adecuada pieza quirúrgica, sin aumentar el riesgo de afectación de los márgenes de la pieza ni un aumento en las complicaciones.