

VACUNACIÓN FRENTE AL VPH EN MUJERES CONIZADAS EN LA UNIDAD DE PATOLOGÍA CERVICAL DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA



Gómez Meseguer, C; Gómez Laencina, AM; Sánchez Vicente, E; Soler Gabaldón, S; Luque Ufarte, MM; Cruz Martínez, L; Abril Alcobas, C

Objetivos: El objetivo principal es analizar la cobertura vacunal frente al VPH en mujeres conizadas en nuestra Unidad. Los objetivos secundarios: Evaluar las causas de ausencia de vacunación, determinar la aceptación de la estrategia de recaptación vacunal y valorar el impacto potencial de la vacunación en la reducción de recurrencias.

Material y Métodos: Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo que incluye a 420 mujeres sometidas a tratamiento escisional cervical entre 2016-2021 en la Unidad de Patología Cervical y Colposcopia del HGURS. Los criterios de inclusión: datos completos sobre vacunación, resultado AP y seguimiento. Se excluyen pacientes con registros incompletos, duplicados o falta de información sobre vacunación.

El análisis de los datos se centró en describir las tasas de vacunación globales y las de recaptación tras modificaciones en el programa regional.

Resultados: El 100% recibió la recomendación de vacunación frente al VPH, cumpliendo con el objetivo mínimo del 90%


Sin embargo, 71 pacientes no llegaron a vacunarse inicialmente, representando el 16,9% del total. Entre las no vacunadas, el 71,4% señaló como principal causa la exclusión por edad. El 19% desconocimiento o falta de información y el 9,5% refirió miedo como motivo. Tras ser informadas sobre la posibilidad de recaptación, la gran mayoría (71,4%) mostraron disposición a vacunarse.

Los resultados de la encuesta revelan un aspecto clave en la mejora de la cobertura vacunal: el acceso a la información y los criterios de financiación anteriores.

Conclusiones: En el ámbito nacional¹, la experiencia de la Región de Murcia se sitúa a la vanguardia al implementar protocolos de recaptación y eliminar las restricciones de edad. Se demuestra que la ausencia de vacunación frente al VPH en mujeres conizadas no se relaciona con rechazo activo, sino con limitaciones administrativas y falta de información. La optimización de la cobertura vacunal en este grupo de riesgo constituye una estrategia clave de prevención secundaria frente a la recurrencia de lesiones cervicales y frente al cáncer de cuello uterino. La experiencia del HGURS aporta evidencia valiosa y extrapolable, consolidando la importancia de la vacunación como parte integral del manejo clínico.

1. Torné A, Andía D, Bruni L, Centeno C, Coronado P, Cruz Quílez J, et al. Prevención secundaria del cáncer de cuello del útero: conducta clínica ante resultados anormales de las pruebas de cribado. Madrid: Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia (AEPCC); 2022 [citado 1 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://www.aepcc.org/wp-content/uploads/2022/11/Guia-Prevencion-cancer-cervix-2022.pdf>
2. Viveros-Carreño D, Fernandes A, Pareja R. Updates on cervical cancer prevention. Int J Gynecol Cancer:394–402
3. Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, et al. Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2024. Disponible en: <https://gco.iarc.who.int/today/>

MOTIVOS NO VACUNACIÓN



■ >45 años ■ Miedo o rechazo ■ Desconocimiento u olvido