

Endometriosis cervical como causa de coitorragia

*Herrington González, A; Castaño Belda, MD; García Lacomba, M; Oltra Escoda, MF; Guilabert Martínez, A; Gómez Sempere, E.
Hospital General Universitario de Elche*

Objetivo

Estudio, revisión y descripción de un caso clínico diagnosticado y tratado en la Unidad de patología cervical del Hospital General Universitario de Elche.

Material y métodos

El trabajo sigue un diseño de caso clínico a propósito de un caso de una mujer de 44 años diagnosticada y tratada en el Hospital General Universitario de Elche.

Resultados

Mujer de 44 años que consulta por coitorragias de un año y medio de evolución. Se realiza exploración ginecológica completa que resulta ser normal, además de solicitar perfil ITS junto con toma de HPV y citología que también resultan negativos.


Se completa el estudio mediante una colposcopia donde se objetiva hacia las 12 horarias zona de erosión epitelial junto con dos puntos violáceos que pudieran corresponder con endometriosis cervical. Se toman biopsias y Anatomía patológica informa de "epitelio escamoso de tipo exocervical con alteraciones citológicas altamente sugestivas de coilocitosis (CIN I). A nivel estromal y en profundidad se advierte de estroma endometrial (con IHQ CD10 positiva) concordante con endometriosis".

Se realiza criocauterio posteriormente sin incidencias.

Persisten coitorragias (aunque más leves). Perfil ITS, citología y HPV de control negativos.

Actualmente en tratamiento desde hace dos meses con dienogest con mejoría de la sintomatología.

En seguimiento en nuestras consultas actualmente.



Conclusiones

La endometriosis cervical es una causa infrecuente pero posible de coitorragia persistente.

Es necesario considerar la endometriosis dentro del diagnóstico diferencial de coitorragia persistente.

El hallazgo histológico de estroma endometrial profundo confirmado por inmunohistoquímica (CD10 positiva) fue determinante para el diagnóstico definitivo.

El tratamiento combinado de criocauterización y terapia hormonal con dienogest podría resultar efectivo a largo plazo para el control de la sintomatología de la paciente.