

# INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL: PREVALENCIA DEL AGENTE CAUSAL SEGÚN GRUPO ETARIO EN EL ÁREA PONIENTE

Ponferrada Rodríguez J<sup>(1)</sup>; Sánchez Baudo N<sup>(2)</sup>; García-Valdecasas García LM<sup>(1)</sup>; Ocete Villegas A<sup>(1)</sup>; González Martínez S<sup>(1)</sup>; Batlle Costa C<sup>(1)</sup>.

<sup>1</sup> MIR Ginecología y Obstetricia Hospital Universitario Poniente; <sup>2</sup> FEA Ginecología y Obstetricia Hospital Universitario Poniente


## OBJETIVOS

Conocer el agente causal más prevalente en las infecciones de transmisión sexual (ITS) sobre una población de mujeres atendidas en nuestro hospital con diagnóstico de ITS (N=117), según su edad, y comprobar su concordancia con respecto a la población general.

## MÉTODO

Se realiza un análisis de la variable "agente causal" de la base de datos de ITS bacterianas del H.U. Poniente, obtenidos a partir de las HC de las pacientes en Diraya. Estudiamos si existe diferencia en el tipo de agente causal de ITS entre las mujeres según su grupo etario, dividiendo al total de mujeres en tres grupos: <25 años, entre 25-65 años y aquellas ≥65. Las muestras biológicas empleadas para el diagnóstico de ITS se han obtenido del cultivo microbiológico de exudado vaginal y/o endocervical.

## RESULTADOS



## CONCLUSIONES

Chlamydia trachomatis es la ITS bacteriana más diagnosticada en los tres grupos, aunque no podemos tener en cuenta su frecuencia en el grupo de mujeres >65 años por el pequeño tamaño no representativo de la muestra.

Si comparamos nuestros datos con el resto de la población, encontramos concordancia puesto que la Chlamydia sigue siendo la ITS bacteriana más frecuente en nuestro país (sin tener en cuenta el VPH al no estar incluido en nuestra base de datos por tener su propio cribado poblacional, siendo esta la ITS más diagnosticada a nivel mundial).