

DIAGNÓSTICO DE DISPLASIA EN PACIENTES CONIZADAS MAYORES DE 60 AÑOS

SANZ BARO, RAQUEL; ROMAN DUQUE, MARCOS; APARICIO RAMIREZ, MARIA; VILAR CANOVAS, ANA; PINEDA DOMÍNGUEZ, LAURA; FERREIRA BORREGO, ISABEL. HU FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

INTRODUCCIÓN

El **diagnóstico de displasia en mujeres postmenopáusicas** tiene **mayor complejidad** por la menor rentabilidad de la colposcopia, que suele ser inadecuada, con tinción acética débil y yodonegatividad generalizada.

En estos casos, cobra especial **importancia el estudio histológico endocervical** y son más frecuentes las **conizaciones diagnósticas** por discordancia cito-histológica o colposcópica.

El objetivo de este trabajo es presentar los **datos del diagnóstico de lesión premaligna de alto grado en pacientes de edad avanzada** y compararlos con una cohorte control.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se revisaron historias clínicas de pacientes mayores de 60 años conizadas entre 2018 y 2024 en el Hospital Fundación Jiménez Díaz. Los datos se compararon con los de una cohorte control de 195 mujeres de entre 25 y 66 años conizadas durante un año.

RESULTADOS

En el periodo analizado se realizaron 48 conizaciones en pacientes mayores de 60 años. El 35 % eran fumadoras y el 11 % nulíparas. El 82,6% presentaban una citología de alto grado (ASCH, HSIL o AGC) y el 92% presentaban un test de HPV + (en el 43,2 % se trataba de HPV 16 o 18).

	COHORTE ANÁLISIS	COHORTE CONTROL
Uso de preservativo	20%	30%
Vacunación	2%	18%
Colposcopia inadecuada	44%	5%
Cambios colposcópicos	38% Grado 1 24% Grado 2	38% Grado 1 63% Grado 2
AP preconización	71,1% CIN 2+ 11,1% CIN 1 17% Sin displasia	96% CIN 2+

Del grupo sin cambios colposcópicos, el 41 % presentó lesión CIN 2 o superior en biopsia exocervical o legado endocervical. El resto fue conizado por CIN 1 o discordancia entre cito-histológica.

CONCLUSIONES

El diagnóstico histológico de lesiones de alto grado en pacientes de edad avanzada es más complejo por la baja rentabilidad de la colposcopia. En estos casos, la histología endocervical y la citología adquieren un papel fundamental tanto en diagnóstico como en las decisiones terapéuticas.