

ESTUDIO RETROSPECTIVO DE CONIZACIONES EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LEÓN



Otero Pardo M, Vega Blanco B, Rodríguez Losada C, Malagón Santos A, Fernández González V, De Lucas Merillas P.

OBJETIVOS



Evaluar la evolución anual en la indicación de nuestras conizaciones, confirmándose una tendencia a favor de lesiones endocervicales, así como estudiar su relación con otras variables como la edad, el genotipo de VPH, los hallazgos de la colposcopia o el resultado histológico del cono.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio retrospectivo de 590 conizaciones realizadas en nuestro hospital en 5 años, del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2024.

RESULTADOS

La edad media fue de **43.3 años** con un rango entre los 20 a los 75. Solo 3 pacientes tenían menos de 25 años y acudían por resultados patológicos de cribados oportunistas. El genotipo más implicado fue el **VPH-16** (48.6% de casos) seguido del 31, 52, 35 y 18. La infección por un solo genotipo se dio en un 62.2% frente a un 37.8% de infecciones múltiples. La indicación fundamental de nuestras conizaciones fue el resultado histológico de **lesiones de alto grado** (91.2%), seguida de discordancias cito-histológicas (4.9%). En los últimos años la indicación por LSIL persistente ha ido disminuyendo notablemente. Dentro de las lesiones de alto grado, aparece una tendencia creciente en la proporción de **conizaciones realizadas por lesiones endocervicales**, pasando de un **16.8%** en el primer año, a un **31.4%** en el 2024. Más del 85% de estas conizaciones realizadas por alteraciones en células glandulares presentaron colposcopias con zona de transformación tipo 3 sin lesiones de sospecha en exocérvis, motivo por el cual se llevó a cabo un legrado endocervical diagnóstico. La edad media en este subgrupo de pacientes aumentó a 48.8 años, con respecto a la media global.



CONCLUSIONES

Tras el estudio realizado en nuestro centro concluimos que el VPH-16 sigue siendo el genotipo viral más implicado así como la indicación de conización por lesiones de alto grado. Sin embargo nos parece importante destacar que existe una tendencia creciente de lesiones endocervicales, asociadas a colposcopias con hallazgos normales, especialmente en mujeres de mayor edad, en el global de nuestras intervenciones. Consideramos, por tanto, que la edad debe considerarse como un factor clínico relevante en la interpretación de la colposcopia y en la toma de decisiones terapéuticas.