

HSIL histológico en pacientes con resultado de screening LSIL VPH no 16/18 en nuestro medio

Sánchez-Pinto Hernández, C; García Vázquez E; Preckler Peña J; Gómez de la Rosa A; Contreras Gonzalez B;
Quesada López Fé A



Introducción:

Determinar cuántas mujeres remitidas a nuestra consulta de patología cervical por citología LSIL presentaban un diagnóstico histológico inmediato de HSIL o más y analizar factores relacionados.

Métodos:

Realizamos un análisis retrospectivo de todas las pacientes que fueron remitidas a nuestras consultas de Patología Cervical por primera vez entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de julio de 2023 con resultado de citología realizada por su matrona o ginecólogo de área LSIL y estudiamos cuántas de estas pacientes presentaban un diagnóstico histológico inmediato de HSIL

Resultados:

Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2023 fueron remitidas a nuestras consultas 163 pacientes por resultado de citología LSIL para realización de colposcopia. 76,23% de estas citologías habían sido realizadas por impronta y 23,77% en medio líquido.

De estas 163 pacientes, 27 de ellas tuvieron un resultado histológico de HSIL tras valoración colposcópica y realización de biopsia. (17,55%)

Se les realizó conización al 93,33% de ellas y el 75,64% tuvieron un resultado definitivo en la AP de la conización de HSIL.

De todas las pacientes con citología LSIL cuya AP realizada en consulta fue de HSIL, un 45% eran portadoras de VPH no 16/18.

Por otro lado, un 17,24% de todas las pacientes a las que valoramos por un resultado citológico LSIL + VPH no 16/18 presentaron una biopsia inmediata informada como HSIL

Conclusiones:

Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2023 fueron remitidas a nuestras consultas 163 pacientes por resultado de citología LSIL para realización de colposcopia. 76,23% de estas citologías habían sido realizadas por impronta y 23,77% en medio líquido.

De estas 163 pacientes, 27 de ellas tuvieron un resultado histológico de HSIL tras valoración colposcópica y realización de biopsia. (17,55%)

Se les realizó conización al 93,33% de ellas y el 75,64% tuvieron un resultado definitivo en la AP de la conización de HSIL.

De todas las pacientes con citología LSIL cuya AP realizada en consulta fue de HSIL, un 45% eran portadoras de VPH no 16/18.

Por otro lado, un 17,24% de todas las pacientes a las que valoramos por un resultado citológico LSIL + VPH no 16/18 presentaron una biopsia inmediata informada como HSIL.

