


Persistencia del Virus del Papiloma Humano (VPH) tras la realización de conización cervical



Introducción:

La **persistencia del VPH** tras conización cervical se considera un factor de riesgo potencial para la recurrencia de la lesión. A la hora de encontrar un factor predictor fiable en estas pacientes se desconoce la interacción real entre persistencia del VPH y márgenes afectos.

Resultados



Objetivo:

Conocer la **persistencia del HPV** tras la realización de una **conización cervical** en pacientes con displasia cervical y **estimar si su permanencia se asocia a mayor tasa de reconización**.

Método:

Estudio **descriptivo retrospectivo** en el H. Virgen de Valme (Sevilla) de enero de 2022 a enero de 2024: Se analizó la **persistencia de HPV** en la **primera revisión postconización** (3 o 6 meses según márgenes +/-).

Discusión/Conclusiones:

- > **HPV + en la 1ª visita tras conización** se asoció de forma directa con la probabilidad de recidiva: recidiva del 75% en pacientes con HPV positivo y márgenes afectados vs 1,6 % en HPV negativo y márgenes libres. HPV fue positivo en prácticamente todas las pacientes sometidas a **reconización (83%)** y a **histerectomía (90,9%)**
- > En el **subgrupo “márgenes quirúrgicos afectados”**, la **tasa de positividad para VPH en la 1ª revisión fue prácticamente el doble** que en aquellas con márgenes libres (40,6% vs 23,5%).
- > Importancia de **HPV como marcador pronóstico** tras conización y del **estado de los márgenes como predictor clínico** de **recurrencia** y persistencia viral.