

Prurito vulvar, la importancia de discernir entre la benignidad y la enfermedad oncológica: a propósito de un caso



Hospital de Figueres - Fundació Salut Empordà, Figueres, Girona. Wentzinger Castro, S.; Dos Santos Oliveira, M.; Sellers Perez, G.; Guerrero Chin Aleong, T.; Pacheco Rojas Rafael, Badia Carrasco, A.

Objetivo

Presentamos un caso clínico que pone de relieve la importancia de diferenciar lesiones sospechosas de malignidad de lesiones crónicas, así como la relevancia de la sintomatología para un diagnóstico precoz. Esto permite un abordaje y manejo interdisciplinar en las lesiones de vulva y garantiza poder ofrecer un tratamiento adecuado según guías clínicas.


Caso clínico

Mujer de **63 años** derivada desde atención primaria por **prurito vulvar** y aparición de **bultoma vulvar de meses de evolución**, tratada con múltiples pautas de antibióticos sin ser derivada a ginecología. Como antecedente oncológico, la paciente había presentado 9 años antes un carcinoma mucinoso de mama, tratado con cirugía conservadora + BSGC + radioterapia + hormonoterapia.

En la primera visita en nuestra unidad se objetiva liquen escleroatrófico difuso en toda la vulva, destacando **lesión exofítica, indurada y ulcerada de 3x3cm** en labio mayor izquierdo, sospechosa de malignidad. La biopsia confirma **carcinoma escamoso VPH independiente p53 mutado**.

Se completa el estudio de extensión con RM y PET-TC, evidenciándose **adenopatía inguinal izquierda**, que se confirma infiltrada en biopsia.

Con estos hallazgos se confirma el **estadio avanzado de la enfermedad** y la **ausencia de indicación quirúrgica**.



Resultados

En comité multidisciplinar se decide realización de **tratamiento radical** con quimioterapia, radioterapia y braquiterapia secuenciales, consiguiendo una **respuesta clínica completa** al mes de finalización del tratamiento.

La paciente presentó **empeoramiento clínico** con **progresión metastásica pulmonar** y **derrame pleural con citología positiva** para células malignas de probable origen vulvar. En el contexto de la progresión desarrolló neumonía aguda e insuficiencia respiratoria, **falleciendo** a los cinco meses del diagnóstico.

Conclusiones y recomendaciones

El carcinoma escamoso de vulva puede manifestarse inicialmente con prurito y cambios sutiles en la piel y mucosa vulvar, con mayor incidencia en pacientes que sufren de liquen escleroatrófico. Es fundamental otorgar valor a esta sintomatología y que las pacientes puedan ser remitidas de forma precoz a las unidades de tracto genital inferior para intentar discernir entre la patología benigna y la maligna, para así abordar la enfermedad neoplásica en estadios precoces, hecho que incrementa la supervivencia.

En este caso, la derivación tardía a nuestra unidad retrasó el diagnóstico y el inicio del manejo oncológico, eliminando la posibilidad de cirugía primaria y condicionando la posibilidad de supervivencia de la paciente.