

Linfangiomas vulvares. A propósito de un caso

Rodríguez Merchante A. ; Pelayo Villanueva E. ; Garrido Gutiérrez C. ; Cabrera Guerra Y.; Delgado Sánchez E. ; Álvarez Bernardi J.



1. ANTECEDENTES

Paciente de 69 años con antecedente en 2015 de **carcinoma epidermoide de cérvix, estadio pT1b1N0** a la que se le realizó una histerectomía radical, anexectomía bilateral y linfadenectomía pélvica bilateral por LPS + RT y QT adyuvante.

Desde entonces presenta **linfedema y celulitis de repetición** en miembros inferiores y monte de venus.

2. HISTORIA ACTUAL

Derivada a la consulta de PTGI para valoración de **lesiones vulvares de reciente aparición** a descartar condilomas. La paciente refiere dolor leve a nivel de las lesiones más grandes.

6. CONCLUSIONES

- Los linfagiomas son una **entidad infradiagnosticada, benigna, y recurrente** y que debería ser considerada en pacientes con antecedentes de **neoplasias malignas pélvicas o radiación del área genital**, así como en caso de **enfermedad de Crohn**.
- Debe hacerse **diagnóstico diferencial** con lesiones herpéticas, condiloma acuminado, cáncer de vulva o molusco contagioso.
- **No hay consenso en cuanto al tratamiento**. No hay evidencia suficiente en cuanto a tratamiento quirúrgico, láser o médico con Imiquimod. Se recomienda fisioterapia en el área de linfedema

3. EXPLORACIÓN Y VULVOSCOPIA



Ante hallazgos, antecedentes del paciente y dolor a nivel de las **lesiones más grandes**, se decide **exéresis** de las mismas.

4. DIAGNÓSTICO

El diagnóstico anatomopatológico fue de **LINFANGIOMAS VULVARES**

5. TRATAMIENTO

Tras el diagnóstico se decidió actitud expectante pues eran milimétricos y asintomáticos. Se remitió a la paciente a fisioterapia