

Satisfacción de pacientes tras conización ambulatoria bajo anestesia intracervical

Estudio observacional descriptivo



Nadia Veiga, Andrea Ilarri**, Maite Osinaga**, Aurora Guillén**.*
Hospital Universitario de Navarra – Hospital García Orcoyen***

OBJETIVO

Evaluar el grado de satisfacción y la percepción del dolor en pacientes sometidas a conización ambulatoria con anestesia intracervical, en el Hospital Comarcal García Orcoyen.

MATERIAL Y MÉTODOS


Estudio **observacional descriptivo**, de **marzo a julio de 2025**, con **23 pacientes** sometidas a conización cervical ambulatoria (asa de diatermia bajo anestesia local mepivacaína al 2% en los cuatro cuadrantes del cérvix).

Se realizó un **cuestionario de satisfacción** a las pacientes el día del procedimiento y se recogieron valoraciones por parte del personal médico. Datos registrados y analizados mediante Microsoft Excel.


RESULTADOS

- **Grado de satisfacción con el procedimiento y los profesionales implicados, escala del 0-10** (0 muy poco satisfecha y 10 muy satisfecha); puntuación de 9/10 en 87%, 13% calificó 8/10.
- **Valoración de los profesionales:**
 - 61% de pacientes “no nerviosa”.
 - Aplicación de anestésico intracervical considerada “fácil de administrar” en todos los casos. En 15 pacientes uso de hemostático tópico (*Spongostan®*) en el lecho quirúrgico, sin considerar dificultad en la hemostasia en un 87% de las conizaciones.

Cuestionario pacientes previo a conización



Descripción del dolor durante el procedimiento



CONCLUSIONES

- La conización ambulatoria bajo anestesia local intracervical con mepivacaína es una técnica segura, bien tolerada y altamente valorada por las pacientes, sin necesidad de anestesia general.
- La aplicación del anestésico no interfiere en el control hemostático, que se consigue con técnicas habituales de coagulación y uso de agentes hemostáticos tópicos.