

Análisis de los cánceres de cérvix diagnosticados en 2024 en nuestro Hospital: relación con el cribado y estadio

Álvarez Gil , C¹. Montes de Oca González, S¹. Delgado Herrero, J.C².

1.Hospital Universitario Jerez de la Frontera

2. Consulta Juan Carlos Delgado Herrero

OBJETIVOS

El cáncer de cérvix es una patología prevenible gracias a los programas de cribado y la vacunación. Sin embargo, aún se diagnostican casos en fases avanzadas. Evaluar la relación entre el cribado y el estadio al diagnóstico puede aportar información clave para mejorar las estrategias de prevención. El objetivo de este trabajo es analizar los casos de cáncer de cérvix diagnosticados en 2024 y sus características generales. Evaluar si existen diferencias significativas en la edad y estadio al diagnóstico según su forma de presentación y diagnóstico.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio retrospectivo incluyendo todos los casos de cáncer de cérvix diagnosticados en 2024. Se recogieron datos de edad, tipo histológico, estadio FIGO al diagnóstico. Se clasificaron en cinco grupos según su relación con el cribado. Se comparó la edad y el estadio al diagnóstico entre los diferentes grupos.

RESULTADOS

Se incluyeron 36 pacientes. La edad media al diagnóstico fue de 49,75 años (33-74). El tipo histológico más frecuente fue el carcinoma escamoso (50%). Dentro de las pacientes que debutaron con síntomas, el sangrado fue el más frecuente. Respecto a la relación con el cribado: 44,4% (16) fueron diagnosticadas dentro del programa de cribado poblacional: 4 de ellas no eran elegibles por edad, 22,2% se diagnosticaron mediante cribado oportunista, 19,4% en seguimiento por patología cervical previa, 5,6% fueron cánceres de intervalo y 8,3% fueron pacientes con test de cribado positivo, pero sin seguimiento posterior. Los estadios FIGO avanzados ($\geq$ II) fueron más frecuentes en las pacientes fuera del cribado (75% de estos casos) frente a las diagnosticadas en el cribado, donde predominó el estadio I.

CONCLUSIONES

Nuestros resultados muestran que la mayoría de los cánceres diagnosticados dentro del cribado se detectaron en estadios precoces, mientras que los casos fuera del cribado presentaron una mayor proporción de estadios avanzados. Esto refuerza la importancia de mejorar la cobertura del cribado.