

ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LA EFICACIA DEL LÁSER DE CO2 EN EL HOSPITAL DE PONIENTE

Batlle Costa C, García - Valdecasas García LM, Ocete Villegas A, Reyes García A, González Martínez S, Ponferrada Rodríguez J

OBJETIVOS

El tratamiento con láser CO2 se ha incorporado en la práctica clínica durante los últimos años como una alternativa eficaz y segura. El objetivo de nuestro estudio es analizar los resultados obtenidos con el uso de láser CO₂ en nuestro centro, principalmente la tasa de curación y la recidiva en patología del tracto genital inferior.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo en el Hospital de Poniente (El Ejido), entre Enero de 2024 y Junio de 2025. Se incluyeron todas las pacientes con lesiones del tracto genital inferior (condilomas, VaIN y VIN) tratadas con láser CO₂.

CONCLUSIONES

El uso de láser CO2 es una nueva opción terapéutica implantada recientemente en nuestro servicio para el tratamiento de PTGI, que ha demostrado ser eficaz especialmente en condilomas y VaIN, con alta tasa de curación y baja tasa de recidiva al año, además de una baja tasa de complicaciones postratamiento.

Así mismo, hace falta seguir investigando con un mayor número de pacientes para confirmar los resultados y valorar su efectividad a largo plazo.

RESULTADOS

17 pacientes

Edad: 30 – 81 años

CONDILOMATOSIS

N = 10 pacientes




Figura 1. Respuesta al tratamiento en los pacientes con condilomatosis.

VaIN

N = 4 pacientes




Figura 2. Respuesta al tratamiento en los pacientes con VaIN.

VIN

N = 3 pacientes




Figura 3. Respuesta al tratamiento en los pacientes con VIN.