

Resultados de las conizaciones en pacientes mayores de 60 años



Sanz Baro, R., Vilar Cánovas, A., Román Duque, M., Aparicio Ramírez, M., Ferreira Borrego, I., Pineda Dominguez, L. (H.U. Fundación Jiménez Díaz)

OBJETIVO

Las conizaciones en pacientes de mayor edad tienen un manejo diagnóstico y terapéutico más complejo y los resultados quirúrgicos son peores. La dificultad técnica es mayor, los márgenes son afectados con mayor frecuencia, las tasas de recidiva son más altas y el porcentaje de cirugía radical por imposibilidad de realizar una conización, también aumenta. El objetivo de este trabajo es presentar los datos de las conizaciones en pacientes de edad avanzada.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se han revisado las historias clínicas de las pacientes >60 años, conizadas entre 2018 y 2024 en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Se han comparado con una cohorte de 195 pacientes conizadas a lo largo de un año entre 25 y 66 años de edad.

CONCLUSIONES

Los resultados de las conizaciones en pacientes de edad avanzada presentan mayores tasas de márgenes afectados y reintervenciones que la población general conizada.

RESULTADOS

Se realizaron 48 conizaciones en >60 años, todas con asa de diatermia. El 71,1% presentaba biopsia previa con CIN2+, y el resto fueron por CIN1 o discordancia citohistológica/colposcópica. En la pieza de conización, el 25% mostró CIN2, el 39,6% CIN3, el 8,3% carcinoma y el 27% no presentó displasia. El 73% tuvo legrado endocervical negativo. Los márgenes fueron libres en el 68,1%, un margen afecto en el 25,5% y ≥ 2 márgenes en el 6,4% (23,4% margen endocervical y 10,6%, margen exocervical). En la cohorte control, la tasa de márgenes afectados fue del 20%. En el primer control postconización, la citología se normalizó en el 71,4% y el test de HPV se negativizó en el 54,3%, frente al 88% y 69% en la cohorte control. La tasa de reintervención (reconización o histerectomía) fue del 71%, muy superior al 20% observado en el grupo control.

	>60 años (n=48)	Controles (n=195)
Biopsia previa CIN2+	71.1%	96%
Carcinoma en la pieza	8.3%	4%
Sin displasia en pieza	27%	14%
Márgenes afectados	25.5%	20%
LEC negativo	73%	—
Citología normal postconización	71.4%	88%
HPV negativo postconización	54.3%	69%
Reintervención	71%	20%