

Desarrollo de vulvovaginitis candidiásica en pacientes tratadas con iSGLT2

Development of candidiasis vulvovaginitis in iSGLT2-treated patients.



INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica con múltiples complicaciones a largo plazo, por lo que se están desarrollando múltiples fármacos para el buen control de la misma. Un tipo de ellos son los iSGLT2 (inhibidores del cotransportador sodio glucosa tipo 2) que disminuyen los niveles de glucemia sin provocar hipoglucemia por su acción a nivel renal y no pancreática. Sin embargo, la glucosuria puede provocar un aumento de infecciones a nivel urogenital.

MATERIAL Y MÉTODOS

Revisión bibliográfica a través de bases de datos electrónicas, en el que incluimos ensayos clínicos, revisiones sistemáticas y guías clínicas desde 2010 a 2025. Mujeres mayores de 18 años tratadas más de 12 semanas.

RESULTADOS

La evidencia revisada muestra que los iSGLT2 incrementan significativamente la incidencia de candidiasis vulvovaginal en mujeres con diabetes tipo 2. Objetivando pacientes con clínica o cultivo positivo.


Se realizaron varios estudios en los que se comparaban grupos de pacientes tratadas con iSGLT2 y otro con iDPP4 en el que se objetiva un riesgo 2.47 veces mayor.

Las especies más frecuentes fueron *Candida albicans* y *Candida glabrata*, sobre todo en mujeres postmenopáusicas.

No hay un iSGLT2 que se asocie a mayor desarrollo de candidiasis.

DISCUSIÓN

Existe debate entre los diferentes estudios sobre la existencia de factores de confusión como higiene, toma de anticonceptivos, gestaciones y menopausia, esta última siendo la más polémica encontrando estudios que están de acuerdo y otros en contra.



CONCLUSIÓN

Los beneficios metabólicos y cardioprotectores de los iSGLT2 justifican su empleo, siempre que se acompañe de vigilancia clínica estrecha, educación preventiva y manejo oportuno de infecciones vulvovaginales, garantizando así un abordaje integral y seguro en mujeres con diabetes tipo 2.