

LINFANGIOMA VULVAR: A PROPÓSITO DE UN CASO

Ayuso, E. Oyonarte, MA. Sanchez C, C.. Valdés, M. Leocadio, C. Torres, C. Hospital Gómez Ulla. Madrid

INTRODUCCIÓN

- **Linfangiomias vulvares:** congénitos o adquiridos
- **Etiología adquiridos:** post-cirugía pélvica, radioterapia, hidradenitis supurativa, celulitis recurrente, enfermedad de Crohn
- **Presentación clínica:** nódulos firmes, pápulas verrugosas, pseudoampollas (linfangiectasia)
- Edema vulvar crónico, firme
- Cambios secundarios: enrojecimiento, descamación, costras

CASO CLÍNICO

Paciente: Mujer de 76 años

Antecedentes:

- **1994:** Cáncer de cérvix estadio IB
- Histerectomía radical + linfadenectomía
- Radioterapia adyuvante
- Remisión completa actual
- **2008:** Linfangiomas vulvares

Presentación clínica:

- Dolor, prurito y edema genital
- Molestias por roce de ropa
- Labios mayores indurados
- Múltiples vesículas 1-2 cm

TRATAMIENTO

Tratamientos previos:

- 2015 y 2020: Exéresis con bisturí eléctrico
- AP: Linfangioma (sin malignidad)
- Recidivas persistentes

TRATAMIENTO ACTUAL (2023) VAPORIZACIÓN CON LÁSER CO₂

- Sedación suave
- Modo quirúrgico y fraccionado
- Potencia: 7W
- Lesión mayor (1.5 cm): exéresis para AP
- Postoperatorio: Nitrofuril 2-3 días
- Alta hospitalaria el mismo día

VENTAJAS LÁSER CO₂

- ✓ Precisión en la exéresis
- ✓ Menor sangrado
- ✓ Mejor cicatrización
- ✓ Mínimas o sin cicatrices
- ✓ Reducción del riesgo de infección
- ✓ Tiempo de recuperación más corto
- ✓ Menor tasa de recidiva

RESULTADOS Y SEGUIMIENTO

Revisión a 2 meses:

- AP: Linfangioma confirmado
- Sin lesiones visibles
- Ausencia de cicatrices o dolor
- Labios mayores menos indurados

Revisión a 6 meses:

- Induración intermitente leve
- Sin lesiones visibles
- Evolución favorable
- **Alta de consultas TGI**



Linfangiomas vulvares



2 meses post-laser



6 meses post-laser

CONCLUSIONES

- La vaporización con láser CO₂ es menos agresiva que técnicas convencionales
- Excelente evolución postquirúrgica sin cicatrices visibles
- Puede realizarse con sedación suave o anestesia tópica (incluso en consulta)
- Menor porcentaje de recidiva
- Técnica prometedora en tratamiento de lesiones del tracto genital inferior