

ADENOCARCINOMA DE CÉRVIX

REVISIÓN DE UNA SERIE DE CASOS

Otero Pardo M, Martín Fernandez M, Malagón Santos A, Rodríguez Losada C, Vega Blanco B, Fernandez Corona A.
Hospital Universitario de León

INTRODUCCIÓN

El **adenocarcinoma cervical** ha emergido como una variante histológica significativa tras el carcinoma escamoso.

Afecta especialmente a **mujeres jóvenes**, fuera del alcance de los métodos de cribado rutinarios, dificultando su diagnóstico precoz.

Este estudio analiza su casuística en nuestro centro y el papel crucial del cribado en su detección.

METODOLOGÍA

- Estudio retrospectivo, observacional y descriptivo.
- Periodo: enero 2021-diciembre 2024.
- Población: 28 pacientes con diagnóstico de adenocarcinoma cervical mediante conización o histerectomía.

CONCLUSIÓN

Nuestros datos evidencian una notable prevalencia del adenocarcinoma cervical en nuestro medio, reforzando la necesidad de fortalecer los programas de cribado para mejorar el diagnóstico precoz y reducir la enfermedad invasiva.

Además, es fundamental no perder de vista las variantes histológicas no vinculadas al VPH, que representan un desafío adicional para la detección y el manejo clínico.

RESULTADOS

Durante el intervalo estudiado, se documentaron **28 casos** de adenocarcinoma de cérvix.

De estos, tres correspondieron a subtipos infrecuentes: uno de células claras y dos villoglandulares.


La **edad media** de las pacientes fue de **52 años**.

El **60.7%** de ellas estaban **asintomáticas**, detectándose alguna alteración en pruebas de cribado.


En el 39.28% restante el **síntoma más frecuente** fue el **sangrado**.

En cuanto a la extensión tumoral, el 25% fueron lesiones in situ y el **75% presentaban invasión** al momento del diagnóstico.


En relación con el **VPH**, se identificaron genotipos de **alto riesgo** en el **71.42%** de los casos, siendo los más frecuentes el VPH 16 seguido por el 18 y el 45.




Adenocarcinoma de células claras




Adenocarcinoma villoglandular



Pacientes asintomáticas detectadas por cribado



Lesiones invasivas al diagnóstico



Presencia de VPH AR