

INCORPORACIÓN DE LA ANOSCOPIA DE ALTA RESOLUCIÓN EN CONSULTA DE PATOLOGÍA DEL TRACTO GENITAL INFERIOR



Nadia Nassar Melic, Marta Padín Fabeiro, Irene Sancho, Pilar Maestro Quibus, Sandra Peiró Baquedano, María Pérez Marqués.
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Objetivos

Implementar la realización de anoscopia de alta resolución en pacientes de consulta de patología del tracto genital inferior que pertenezcan a los grupos de riesgo recomendados por la IANS para el cribado de cáncer anal y con pruebas de cribado patológicas.

Material y métodos

Se ha llevado a cabo la formación de especialistas en ginecología en la técnica de **anoscopia de alta resolución**. Se han analizado las recomendaciones basadas en la evidencia recogidas en la guía de la IANS para el cribado de cáncer anal. El cribado se realiza mediante cotest anal (citología y test de VPH).

Se ha elaborado un consentimiento informado, un protocolo clínico de consulta y un algoritmo de cribado adaptado a los recursos disponibles. Así mismo, se han establecido indicadores de actividad y resultados para el seguimiento del proyecto.

Resultados

Hasta la fecha, se está realizando cribado en pacientes revisadas en consulta de PTGI por patología dependiente de VPH y que pertenecen a los grupos de riesgo definidos por la Asociación Internacional para la Prevención de Neoplasia Anal. Entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, se cribaron **57 pacientes** incluidas en categoría de riesgo. La edad media fue de 52,7 años. El 56,1 % estaban vacunadas contra el VPH y el 26 % eran fumadoras. El principal motivo de indicación para el cribado fue el **antecedente de HSIL cervical o vaginal**, seguido de la inmunosupresión. El 10,4 % presentaron citología anal alterada, siendo todas ellas ASCUS/LSIL. El 36,8 % resultó positivo para VPH anal. Se realizaron 9 anoscopias, con un tiempo medio de espera de 90 días. El índice EVA fue de 5.

Conclusiones

Actualmente, no es posible presentar resultados definitivos debido a que el proyecto tiene una duración prevista de dos años. Sin embargo, los resultados preliminares sugieren la importancia de enfatizar en los aspectos de implementación del cribado de cáncer anal en mujeres con factores de riesgo asociados a patología por VPH.